




Classe des Amphibiens
Ordre des Anoures
Famille des Bombinatoridés

Le Sonneur à ventre jaune (*Bombina variegata*)


Niveau Expert



Où le chercher en France?



Quand le chercher ?



Où le chercher en forêt ?

- Ornières de forêt et fossés en bordure des chemins
- Biotopes aquatiques variée : mares permanentes ou temporaire, bordures marécageuses d'étangs, anciennes carrières inondées, eaux stagnantes peu profondes, ensoleillées

Pourquoi le chercher ?

- Considéré comme disparu dans certaines régions et départements ...

UICN France :  (Vulnérable)



Ailes dessus



CCBY-NC-ND J. Soret

Description

- Forme de crapaud de 4 à 5 cm de long
- Face dorsale brune terreuse et face ventrale, gorge et dessous des pattes marbrés jaune vif à orangé sur fond noir cendré ou bleu nuit
- Verrues cutanées souvent rehaussées de petites épines noires
- Corps aplati et museau arrondi de profil
- Pupille arrondie, triangulaire ou en forme de coeur

Caractères biologiques

Habitat

Milieu bocager, prairies et lisières de forêts

Alimentation

Vers et insectes de petite taille (adultes), algues, diatomées, collemboles (têtard)

Reproduction

- De mai à juin dans l'eau, dans des zones bien ensoleillées
- Maturité sexuelles entre 3 à 4 ans
- Ponte de plusieurs dizaines, voir centaines d'oeuf déposés en petits amas sur brindilles immergées ou sur des plantes aquatiques
- Eclosion 5 jours après la ponte

L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel.

Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/lobservatoire/2-comment-participer/>