

FICHE DE DISTINCTION : LANGUE DE BŒUF ET POLYPORE HÉRISSE

À noter que le Polypore hérissé ne fait pas partie de la quête, cette fiche sert à distinguer le Langue de bœuf et le Polypore hérissé de part leur forte ressemblance.

LANGUE DE BŒUF

Fistulina hepatica

Chapeau : 10 à 20 cm de diamètre et 2 à 6 cm d'épaisseur
Se trouve sur d'arbres feuillus blessés, tels que les chênes
et parfois les châtaigniers

Chapeau rouge
brique

Apparence
visqueuse

Chapeau porté par
un pied court



POLYPORE HÉRISSE

Inonotus hispidus

Taille : 10 à 30 cm de diamètre et 4 à 9 cm d'épaisseur
Se trouve sur les troncs et branches d'arbres feuillus, tels
que les frênes, ormes, noyers et platanes

Chapeau orange ou
rougeâtre

Surface ondulée
ou bosselée

Chapeau
sans pied



L'Observatoire de la Biodiversité des Forêts est un programme national de sciences participatives ouvert à tous ! Il a pour but d'obtenir, en France métropolitaine, des données qualitatives (observations et photographies) sur la biodiversité forestière pour compléter l'Inventaire National du Patrimoine Naturel. Pour participer : <https://biodiversite-foret.fr/observatoire/2-comment-participer/>